

Thuốc giảm đau chưa có số đăng ký



일반의약품

대한민국로선

안티푸라민[®]에스 로선

【원료약품 및 분량】로선 1g 중

■유효성분: 살리실산메틸 (KP) - 200mg,
L-멘톨 (USP) - 60mg

■첨가제: 라놀린유, 경질유동파라핀,
모노스테아린산소르비탄, 폴리소르베이트60,
트롤아민, 카보머941, 정제수


【성상】박하향이 나는 백색의 전질균등한 현탁성의 로션제

【용법·용량】1일 1~4회 환부(질환부위)에 적당량을 바릅니다. ※바른 후 약액이 충분히 흡수되고 건조된 후에 마시지
하시고, 지나치게 무리한 힘을 가하지 않도록 주의하십시오.

【효능·효과】• 다음 증상의 진통·소염(항염): 뱀, 타박상,
근육통, 관절통, 골(뼈)절통, 요(허리)통, 어깨결림, 신경통,
류마티스통증 • 피부가려움, 벌레물린데 • 동창(연상창)

【저장방법】기밀용기, 실온보관(1~30°C)

※사용상의 주의사항 등 상세한 내용은 첨부문서를 참조
하십시오. ※제조번호 및 사용기한은 용기 밑면 참조

제조의뢰·판매자:  유희양행

본사: 서울시 동작구 노량진로 74

공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219

제조사: (주)한국콜마

세종특별자치시 전의면 산단길 245



YJ247590/08

123

Thuốc giảm đau chưa có số đăng ký

안티푸라민에스
100ml



일반의약품 100ml



안티푸라민에스
Antiphramine Sports

관절통
신경통
근육통
운동전후에



관절통, 림프관통



근육통, 근육피로



신경통, 허리통증

Soft
Speedy
Strong



유한양행

안티푸라민에스
로션

4. 일반적주의 1) 정해진용법, 용량을 잘 지킵니다. 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용합니다. 3) 5~6일간 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사나 의사와 상의합니다. 5. 적용상의주의 1) 이약은외용으로만 사용하고 내복하지 않습니다. 2) 눈에 들어가지 않도록 주의 합니다. 만일 들어간 경우에는 물로 씻습니다. 증상이 심할 경우에는 안과 의사의 치료를 받습니다 3) 적용부위를 깨끗이 닦고, 외부의 열이나 뜨거운 물에 노출 하지 않습니다. 6. 저장상의주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다. 3) 오용 (잘못된 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

홈페이지 : www.yuhan.co.kr

소비자상담실 : 080-024-1188

빈 포장재는 분리수거하여 주십시오.

● 제조의뢰·판매자 :
(주)유한양행
본사 : 서울시 동작구 노랑진로 74
공장 : 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219
● 제조원 : (주)한국콜마
세종특별자치시 전의면 산단길 245



8 806421 010220

Thuốc giảm đau chưa có số đăng ký

JI 428086/10A

일반의약품

안티푸라민[®]에스로션

분류번호 : 264 (진통·진양·수렴·소염(항염)제)

[개요 및 특징]

안티푸라민은 80년 이상 애용된 자체 국산 브랜드로서, 로션 타입인 안티푸라민에스로션은 근육통, 관절통, 신경통 등 각종 통증 및 발레올린데, 피부가려움, 등창(언 상처)에 효과적으로 사용할 수 있습니다.

안티푸라민에스로션은 특수기제인 액상라놀린을 사용하여 피부에 부드럽고 신속하게 흡수됩니다.

안티푸라민에스로션은 기름기가 남지 않아 끈적이지 않으며, 옷 등에 잘 묻지 않습니다.

안티푸라민에스로션은 부드러운 로션제형으로서 신체 굴곡 부위에도 쉽게 사용할 수 있습니다.

안티푸라민에스로션은 원터치 캡으로 되어 있어 사용이 간편하며, 지압용기를 통한 마사지 효과로 더욱 강한 약효를 발휘합니다.

【원료약품 및 분량】 로션 1g 중

- 유효성분 살리실산메틸(KP) ----- 200mg
Q-멘톨(USP) ----- 60mg

- 첨가제: 라놀린유, 경질유동파라핀, 모노스테아린산소르비탄, 폴리소르베이트60, 트롤라민, 카보머941, 정제수

【성상】

박하향이 나는 백색의 전질균등한 현탁성의 로오손제

【효능·효과】


- 다음 증상의 진통·소염(항염)
: 뺨, 타박상, 근육통, 관절통, 골(뼈)절통, 요(허리)통,
어깨결림, 신경통, 류마티스통증
- 피부가려움, 발레올린데
- 등창(언 상처)

【용법·용량】


1일 1~4회 환부(질환부위)에 적당량을 바릅니다.

※ 바른 후 약액이 충분히 흡수되고 건조된 후에 마사지하십시오.


※ 지압용기에 무리한 힘을 가해 사용할 경우 피부, 의복 등에 손상을 일으킬 수 있으므로 사용에 주의하시기 바랍니다.



관절통, 뻣데, 멍든데



운동전후 근육통, 근육피로에



신경통, 허리통증, 어깨결림에

Antipharmine

Thuốc giảm đau chưa có số đăng ký

[사용상의 주의사항]

1. 다음 부위에는 사용하지 마십시오.

- 1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
- 2) 습진, 옷 등에 의한 피부염, 상처부위, 민감한 피부

2. 다음 환자에는 신중히 사용하십시오.

- 1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상 (예를 들면 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 옷 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자
- 3) 습윤(습기 참)이나 미란(진무름)이 심한 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 5) 순환기 장애 또는 당뇨병 환자
- 6) 12세 이하의 소아

3. 부작용

이 약의 사용으로 인해 발진·발적(충혈 되어 붉어짐), 가려움 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 약사 또는 의사와 상의합니다.


4. 일반적주의

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용합니다.
- 3) 5~6일간 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 사용을 중지하고 약사나 의사와 상의합니다.


5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 않습니다.
- 2) 눈에 들어가자 않도록 주의합니다. 만일 들어간 경우에는 물로 씻습니다. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받습니다.
- 3) 적용부위를 싸거나 감지 않고, 외부의 열이나 뜨거운 물에 노출하지 않습니다.


6. 저장상의 주의사항



- 1) 어린 이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 합니다.



- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관 합니다.



- 3) 오용 (잘못된 사용) 을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

[사용기한] 외부포장에 표기

[포장단위] 100mL, 500mL

- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결 기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서의 개정연월일 이후 변경내용은 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의 및 신고하시기 바랍니다.

첨부분서 개정연월일 : 2017. 7. 17



제조의회 · 판매자

유한양행

본사: 서울시 동작구 노량진로 74
공장: 충북 청주시 청원구 오창읍연구단지로 219

홈페이지 : www.yuhan.co.kr
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자 요금 부담)

제조사 : (주)한국콜마 / 세종특별자치시 전의면 산단길 245